

INTERFLYTOX® KÖDER

Hochwirksames Granulat zum portionsweisen
Auslegen oder Streichen

- Sexuallockstoff (z)-9-Tricosen
- Fraß- und Kontaktgift Acetamidrid
- Gute Sofort- und Dauerwirkung
- Kein Sprühnebel, daher – bei sachgemäßer Anwendung – hervorragend für den belegten Stall geeignet

Anwendungsbereich:

Fliegen sind potentielle Virusüberträger für die Vesikuläre Schweinekrankheit, die Aujeszky'sche Krankheit sowie für die Europäische Schweinepest. Fliegen können Reservoir und Verbreiter von Bakterien sein und die Erreger der Salmonellose, der Brucellose und des Rotlaufes übertragen. Außerdem verursachen die Fliegen Stress bei den Zuchttieren. Gewichtsverlust der Tiere und damit weniger Wirtschaftlichkeit für die Intensivtierhalter können die Folge sein. INTERFLYTOX® KÖDER macht Schluss mit den Fliegen im Stall. Der INTERFLYTOX® KÖDER wird insbesondere dort eingesetzt, wo der Spritznebel eines herkömmlichen Fliegenbekämpfungsmittels unerwünscht ist. Dies bedeutet: Der INTERFLYTOX® KÖDER

ist, bei sachgemäßer Anwendung, das ideale Produkt für belegte Ställe, wie z. B. Schweine-, Rinder-, Pferde-, Schaf-, Ziegen-, Nerz- und Geflügelställe.

Anwendungsmethode und Dosierung:

INTERFLYTOX® KÖDER können Sie als Granulat oder als Streichmittel verwenden.

Anwendung als Granulat

Streuen Sie das Granulat flach (keine Häufchen) in

mehrere flache Schalen, z. B. aus Pappe oder Blech. Die Schalen überall dort aufstellen, wo der Fliegenbefall besonders stark ist. Mehrere Schalen mit weniger INTERFLYTOX® KÖDER sind dabei wirkungsvoller als eine Schale mit viel INTERFLYTOX® KÖDER. Bitte darauf achten, dass INTERFLYTOX® KÖDER nicht ins Futter gelangt und für Nutz-, Haus- und wildelebende Tiere unerreichbar ist.



Anwendung
als Streichmittel

INTERFLYTOX® KÖDER wirkt auch sehr gut als Streichmittel. Mischen Sie hierfür im Verhältnis 1:1 (1 g auf 1 ml) INTERFLYTOX® KÖDER mit ca. 40° C warmem Wasser. Die Lösung auf bevorzugte Fliegenplätze (Fenster- und Türrahmen, Leitungen) oder auf Holztafeln streichen und diese an Stellen mit starkem Fliegenbefall (unerreichbar für andere Tiere) aufhängen.

Wichtige Hinweise:

Bei Produkten mit Sexuallockstoff nicht zu viele Stellen bestreichen bzw. nicht zu viele Köder auslegen da die Fliegen sonst irritiert werden. Wir empfehlen ca. 6 m Abstand zwischen den Köderstellen. Für 40 m² reichen 100 g für eine Erstauslegung. Bitte darauf achten, dass starke Zugluft in diesen



Bereichen vermieden wird. Staub vermindert die Wirkung des Produktes.

Wirkung:

Der Sexuallockstoff (z)-9-Tricosen zwingt weibliche und männliche Fliegen, so lange das Kontakt- und Fraßgift Acetamiprid aufzunehmen, bis sie absterben. Die Wirkung setzt schlagartig ein. Dadurch sind Resistenzentwicklungen der Fliegen praktisch ausgeschlossen.

Wirkstoffbasis:

100 g des Granulats enthalten 0,5 g Acetamiprid, 0,6 g (z)-9-Tricosen

baua-Reg.-Nrn.:

N-33206 (PT 18),
N-33207 (PT 19)



Lieferform:

400-g-Dose, 2-kg-Dose

Gefahrenhinweise:

Piktogramme: entfällt
Signalwort: entfällt

Ihre Produktalternativen:

INTERLARVTOX® M
INTERLARVTOX® GRANULAT

Wir empfehlen die zusätzliche Bekämpfung der Fliegen schon im Larvenstadium.

INTERFLYTOX®
INTERFLYEX®
INTERFLYTOX® P
INTER® EX

Alternative Produkte zum Sprühen gegen Fliegen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zu beziehen durch:

0918
W080

