

# INTERKOKASK®



## Das Breitband-Stalldesinfektionsmittel gegen Kokzidien-Oozysten, Spulwurmeier, Bakterien, Pilze und Viren. Beseitigt auch Milben und Milbeneier

- Von der DGV (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) bestätigte Wirkung gegen Kokzidien-Oozysten und Wurmeier (Bescheinigung vom 13.01.2007)
- Begutachtete Wirkung gegen behüllte Viren nach DVG-Richtlinien (Prof. Dr. Truyen, Leipzig)
- Geprüfte Wirksamkeit gegen Bakterien bei 4°C (General Order/Defra)

### Anwendungsbereiche:

Übliche Desinfektionsmittel können Dauerformen von Endoparasiten nicht abtöten. Darum wird INTERKOKASK überall dort eingesetzt, wo auch die Bekämpfung von Kokzidien-Oozysten, Wurmeiern und Wurmlarven besonders wichtig ist: z. B. in Hühner-, Puten-, Schweine-, Rinder- und Kaninchenställen sowie in Taubenschlägen. Und die Bekämpfung von Endoparasiten ist wichtig. Denn sonst können u. a. schlechte Futterverwertung, vermehrter Futterverbrauch, Kümern und erhöhte Krankheitsanfälligkeit die Folge sein. Dies führt u. U. zum verminderten Schlachterlös oder sogar zum Tod der Tiere.

### Anwendungsmethode und Dosierung:

Tiere aus dem Stall entfernen und Stall gut reinigen.

Mit INTERKOKASK die gesamten Stallflächen oder zumindest Fußböden, Geräte und Wände bis 1,50 m Höhe satt besprühen. Zum Versprühen sind Hochdruckgeräte und andere Sprühgeräte geeignet. Kleinere Flächen können Sie auch nass wischen.

Ritzen und Spalten, Kotbänder, Unterseiten von Käfigen, Sitzstangen und Nester besonders beachten. Über 1,50 m Höhe halten sich keine Endoparasiten auf, deshalb können Sie dort auch TAD CID, INTERSTERIL, RHODASEPT oder INTERSPOROL verwenden.

Nachspülen ist nicht nötig. Stall nach gründlicher Lüftung und vollständiger Abtrocknung wieder belegen.

### Dosierungsbeispiel

INTERKOKASK	+ Wasser	=	Gebrauchslösung
200 ml	10 Liter		2%


Die Aufwandmenge der Gebrauchslösung nach DVG beträgt 400 ml pro m<sup>2</sup> Fläche.

### Mikrobiologische Wirkung:

Wurmeier und Kokzidien-Oozysten sind außerordentlich widerstandsfähig, denn sie



besitzen eine 3-schichtige Hülle, bestehend aus Eiweiß, Chitin und Lipiden, die ihnen einen besonderen Schutz verleiht und lange Überlebensdauer garantiert. Durch herkömmliche Desinfektionsmittel, höhere Temperaturen, Gase und andere Desinfektionsverfahren können diese Schädlinge daher nicht abgetötet werden. Nur Desinfektionsmittel mit einer lipidlösenden Komponente, wie z. B. INTERKOKASK, sind in der Lage, die parasitären Dauerformen zu vernichten. INTERKOKASK vernichtet u. a. folgende parasitäre Dauerformen:



**Starker Spulwurmbefall im Darm eines Schweines**

und Viren. Auch Milben und Milbeneier werden beseitigt.

**Besondere Hinweise:**

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Klei-

dung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

**Wirkstoffbasis:**

100 g enthalten  
24,9 g Chlorkresol

**bauc-Reg.-Nrn.:**

N-15423, N-15424, N-17225

**Lieferform:**

1-kg-Flasche  
10-kg-Kanister  
120-kg-Fass

Bereich	Anwendungskonzentration	Einwirkungszeit
Behüllte Viren	1 %	1 Stunde
Spulwurmeier	2 %	2 Stunden
Bakterien	2 %	30 Minuten
Milbeneier/Milben	3 %	
Kokzidien-Oozysten	4 %	2 Stunden

**Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Zu beziehen durch:



Vertrieb Österreich: PROCHEMA Handelsgesellschaft m.b.H., Business Unit AGRO, Ateliergasse 1, A-1220 Wien  
 Telefon +43 (0)1 203 40 41, Fax +43 (0)1 203 40 41-20, Mobil +43 (0) 664 526 55 10  
 www.prochema.com • office.agro-wien@prochema.com  
 Vertrieb Schweiz: PROVET AG, Gewerbestraße 1, CH-3421 Lyssach,  
 Telefon +41 (0) 34 445 20 93, Fax +41 (0) 34 445 20 93  
 www.provet.ch • provet@provet.ch