

Stallfliegenmittel Alba[®]

Wirkstoff: 26,0 g Clothianidin /l
Lockstoff: 0,5 g Tricosene /l
Paste (PA)

Gefahrensymbol: Xi, N

Versandgebinde: 10 x 500 ml Dose

Registrier-Nrn.: N-35776
N-35777

Streich- und Spritzmittel gegen Fliegen in Ställen

Anwendung

Wirkungsweise

Stallfliegenmittel Alba ist ein Streich- und Spritzmittel zur Bekämpfung von Fliegen in Ställen. Es wird punktuell an Wänden, Pfosten, Fenstersimsen usw. ausgebracht. Das Mittel wird an den bevorzugten Rastplätzen der Fliegen eingesetzt. Beim Erscheinen der ersten Fliegen ist mit der Behandlung zu beginnen.

Für eine gute Wirkung sollte die Anwendung des Mittels möglichst auf vielen kleinen Flächen, gleichmäßig im Stall verteilt, erfolgen.

Stallfliegenmittel Alba hat als Fraß- und Kontaktinsektizid gegen die im Stall vorkommenden Fliegen eine hervorragende Sofortwirkung sowie eine Dauerwirkung von 6 - 8 Wochen. Aufgrund des Lockstoffgehaltes ist es sehr attraktiv für die Stallfliege (*Musca autumnalis*) und die in Ställen vorkommende Stubenfliege (*Musca domestica*), die es schnell von den behandelten Flächen aufnehmen.

Anwendungstechnik / Dosierung

Für einen Stall von 200 m² Bodenfläche werden 500 ml **Stallfliegenmittel Alba** benötigt.

1. Streichverfahren

Im Streichverfahren lässt sich **Stallfliegenmittel Alba** auf sehr einfache Art ausbringen. Durch die hohe Konzentration des Streichbelages wird gleichzeitig eine hohe Wirkungssicherheit erreicht.

Stallfliegenmittel Alba®

Die streichfähige Paste ist mit einem Pinsel unverdünnt auf möglichst viele kleine Flächen (für 200 m² Stallgrundfläche ca. 60 Streifen a 10 x 30 cm) an Wänden, Boxenwänden, Pfosten, Fensterleibungen, Milchleitungen usw. in Tiernähe (jedoch außerhalb der Reichweite der Tiere) aufzutragen. Produkt bevorzugt dort aufbringen, wo sich Fliegen gerne aufhalten. Dabei ist darauf zu achten, dass **Stallfliegenmittel Alba** auf sauberem, nicht saugfähigem Untergrund punktförmig konzentriert aufgebracht wird.

In Ställen, in denen keine ausreichenden Anstreichmöglichkeiten vorhanden sind oder eine geringe Verfärbung des Untergrundes nicht in Kauf genommen werden kann, empfiehlt sich ein Aufhängen von ca. 60 bestrichenen, wenig saugfähigen Pappkartonstreifen oder ähnlichem (Größe ca. 20 x 15 cm (DIN A5)) über den Boxen in Tiernähe (ebenfalls außerhalb ihrer Reichweite).

2. Spritzverfahren

Die Anwendung von **Stallfliegenmittel Alba** im Spritzverfahren ist ebenfalls möglich.

Dazu werden für 200 m² Stallgrundfläche 500 ml **Stallfliegenmittel Alba** in 1,0 Liter Wasser eingerührt und mit einer Rücken- oder Handspritze bei geringem Druck gleichmäßig an möglichst vielen Stellen, wo sich Fliegen bevorzugt aufhalten, an Decken, Pfosten, Wänden, Boxenwänden, Fensterleibungen, Milchleitungen usw. in Tiernähe (jedoch außerhalb der Reichweite der Tiere) ausgespritzt.

Mit der Spritzbrühemenge von 1,5 l sollten möglichst viele kleine Flächen (ca. 60) behandelt werden, die, gleichmäßig im Stall verteilt, ca. 10% der Stallgrundfläche entsprechen.

In Ställen, in denen keine ausreichenden Ansprühflächen vorhanden sind oder eine geringe Verfärbung des Untergrundes nicht in Kauf genommen werden kann, empfiehlt sich ein Aufhängen von besprühten, wenig saugfähigen Pappkartonstreifen oder ähnlichem in entsprechender Größe und Verteilung über den Boxen in Tiernähe (ebenfalls außerhalb ihrer Reichweite).

Zur Beachtung

Stallfliegenmittel Alba ist möglichst in Tiernähe im Stall zu verteilen. Während der Anwendung können die Nutztiere im Stall bleiben.

Es muss aber sichergestellt sein, dass die Tiere den Belag nicht erreichen bzw. ablecken können. Ein Besprühen der Tiere sowie Über- und vor allem Unterdosierungen sind zu vermeiden.

Das mit Wasser angerührte Mittel (beim Spritzverfahren) muss am Tag der Zubereitung ausgebracht werden. Verschmutzte, sehr poröse und saugfähige, feuchte oder frisch gekalkte Wände nicht behandeln. Die Behandlung

ist bei Bedarf zu wiederholen; bei starker Staubentwicklung kann dies in kürzeren Zeitabständen notwendig werden. Nach der Anwendung kann es zu einer schwachen Verfärbung der behandelten Wände kommen.

Hinweise für den sicheren Umgang

Hinweise zum Schutz des Anwenders

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Arbeit Hände und andere evtl. kontaminierte Körperpartien gründlich waschen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Kontamination von Futterkrippen und Tränkevorrichtungen vermeiden.

Erste-Hilfe

Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut sofort mit Wasser, anschließend mit Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung vor Wiederbenutzen waschen. Wenn Symptome auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Kontaktlinsen entfernen. Unverzüglich Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Entsorgung

Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit separiertem Verschluss abzugeben.

Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet unter www.pamira.de.

Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

Stallfliegenmittel Alba®

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien/GefStoffV

Kennzeichnungssymbol: Xi, N

R43 - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R51/53 - Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S2 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S13 - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S24 - Berührung mit der Haut vermeiden.

S35 - Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

S37 - Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S46 - Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S57 - Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden.